


Bulletin d'Informations de Pharmacovigilance

Volume 2, Numéro 12, 2005

L'évaluation continue des profils d'innocuité des produits de santé dépend de la qualité de vos déclarations



✚ Mise à jour du mois

Vaccination chez la femme enceinte

✚ Contact

Pour signaler des effets indésirables ou pour toute demande d'information sur les produits de santé, communiquer avec le Centre Marocain de Pharmacovigilance (CMPV)

Tél : 0810 00 180

Fax : 037 77 71 79

✚ Bloc-notes

Société Marocaine de Pharmacovigilance. Pour toute demande d'adhésion ou d'information, contactez le 037 68 64 64

Bulletin préparé par le Centre Marocain de Pharmacovigilance

Vaccination chez la femme enceinte

La grossesse n'est pas forcément le moment idéal pour entreprendre une vaccination mais les circonstances peuvent faire que les deux situations se produisent ensemble. Soit parce que le médecin estime qu'une vaccination est nécessaire pour la patiente à ce moment présent, ou parce que la vaccination a été faite alors que la grossesse n'était pas encore connue.

Quel que soit le niveau de recommandation (possible, à éviter ou déconseillé), si la vaccination est justifiée du fait d'un voyage imprévu en zone endémique, d'un contexte épidémique ou professionnel, elle doit être réalisée.

Une vaccination, quelle qu'elle soit, réalisée par mégarde chez une femme enceinte ne justifie pas d'interrompre la grossesse.

Par ailleurs, lorsqu'une vaccination spécifique est envisagée chez une femme enceinte, il est souhaitable de préférer dans la mesure du possible une forme monovalente si elle existe.

La réévaluation récente des risques et bénéfices de la vaccination en cours de grossesse a conduit aux recommandations suivantes :

Vaccins	Type	Risques / bénéfices
VACCINS AUTORISES ET UTILES PENDANT LA GROSSESSE	Tétanos l'anatoxine du bacille (clostridium tétani)	plusieurs travaux ont confirmé la transmission de l'immunité de la mère vaccinée pendant sa grossesse à son nouveau-né et l'innocuité totale de cette vaccination.
	Polio (Injectable) virus tué	Ce vaccin peut être réalisé pendant la grossesse mais doit être réservé aux femmes qui voyagent dans des zones d'endémie, il a une bonne efficacité. L'immunité protégera l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois environ.
	Grippe virus tué	Cette vaccination est efficace et bien tolérée pendant la grossesse, elle protège aussi l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois environ.
	Hépatite B fraction du virus inactivé	On vaccine les femmes enceintes quand il existe un risque non négligeable d'attraper la maladie (toxicomanie, contact avec un sujet atteint, etc.). Le vaccin garde une bonne efficacité pendant la grossesse
	Méningocoque A et C	en raison de l'absence de données pertinentes. Leur utilisation, est justifiée au cas où existerait un risque infectieux important ; voyage imprévu en zone endémique, contexte épidémique, contexte professionnel.
VACCINS A NE PAS FAIRE PENDANT LA GROSSESSE	Rubéole	La vaccination est toujours contre indiquée chez la femme enceinte et doit être effectuée chez des patientes uniquement sous contraception 2 mois avant et 2 mois après. Pourtant si la transmission du virus à l'embryon existe dans 1 à 2 % des cas, aucun problème particulier n'est apparu de façon significativement notable chez les enfants sur des milliers de cas avec plusieurs années de recul pour certaines études. La vaccination anti rubéole pendant la grossesse ne doit être à l'heure actuelle en aucun cas une indication d'avortement
	Rougeole.	Risque de Fausses couches par hyperthermie
	Oreillons vaccin vivant	Risque de Fausses couches dans 30% des cas mais pas de risque de malformation.
	Fièvre Jaune	Déconseillé par le Center disease control (CDC) d'Atlanta et l'Institut Pasteur bien qu'aucune étude n'ait rapporté des risques de tératogénicité. S'il doit être fait pour des raisons obligatoires dans certains pays, le pratiquer au cours du 2 ^{ème} ou 3 ^{ème} trimestre.
	Polio (Voie orale, vaccin vivant)	Cette vaccination est contre indiquée pendant la grossesse bien qu'aucun problème n'ait jamais été rencontré chez des femmes l'ayant reçu.
	BCG	Contre indiqué chez la femme enceinte, on aura recours à l'antibiothérapie en cas de tuberculose maladie.
VACCINS DÉCONSEILLE OU OCCASIONNELS PENDANT LA GROSSESSE	Diphthérie	Très mal toléré chez l'adulte, donc avec précautions chez la femme enceinte car il entraîne des réactions fébriles importantes.
	Coqueluche	Risques importants de réactions vaccinales (fièvre) avec risque de FC et d'accouchement prématuré.
	Thyphoïde.	Pas d'évaluation chez la femme enceinte, il est par conséquent déconseillé.
	Hépatite A	Déconseillé de principe par absence de données.
	Rage	S'impose après toute contamination certaine ou suspecte compte tenu du pronostic grave de la rage
	Pneumocoque	A faire chez la femme enceinte lors de ses indications reconnues (splénectomie accidentelle, hémoglobinopathie)
	Hémophilus influenzae B	Ne possède pas l'AMM chez la femme enceinte. Mais efficace et dénué d'effets secondaires chez la femme enceinte